

# Πίνακας Δικαιούχων Αναμνηστικής δόσης Εμβολίων στην Ελλάδα (1/3)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το γενικό πληθυσμό σχετικά με τον εμβολιασμό του

Ηλικιακή Ομάδα	Εμβόλια	Βασικός εμβολιασμός	1 <sup>η</sup> Αναμνηστική	2 <sup>η</sup> Αναμνηστική	3 <sup>η</sup> Αναμνηστική
<b>Γενικός Πληθυσμός</b>					
6 Μηνών – 4 Ετών	Pfizer 6M – 4E (COMIRNATY)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση → 3 <sup>η</sup> δόση	Δεν έχει εγκριθεί	Δεν έχει εγκριθεί	
5 - 11 ετών	Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY) (Για ηλικίες 5 έως <12 ετών)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	Δεν έχει εγκριθεί	
12 – 17 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	
18 – 29 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax	Έχει εγκριθεί μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου (Πίνακας 2)	
30 – 59 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)
60 και άνω	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)

Παρατηρήσεις

^ Η ΕΕΕ συνιστά το μεσοδιάστημα των 8 εβδομάδων μεταξύ των δύο δόσεων του βασικού εμβολιασμού

^^ Για τις ηλικίες 6 μηνών έως 4 ετών, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech χορηγείται με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΕΕΕ σε άτομα με προηγηθείσα νόσηση από κορωνοϊό δίνεται η δυνατότητα αναμνηστικού εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη νόσηση

## Πίνακας Δικαιούχων Εμβολίων στην Ελλάδα (2/3)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για πολίτες αυξημένου κινδύνου σχετικά με τον εμβολιασμό τους

Ηλικιακή Ομάδα	Εμβόλια	Βασικός εμβολιασμός	1 <sup>η</sup> Αναμνηστική	2 <sup>η</sup> Αναμνηστική	3 <sup>η</sup> Αναμνηστική
<b>Πολίτες Αυξημένου Κινδύνου</b>					
6 Μηνών – 4 Ετών	Pfizer 6M – 4E (COMIRNATY)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση → 3 <sup>η</sup> δόση	Δεν έχει εγκριθεί	Δεν έχει εγκριθεί	
5 - 11 ετών	Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY) (Για ηλικίες 5 έως <12 ετών)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer Παιδιατρικό (COMIRNATY)	Δεν έχει εγκριθεί	Δεν έχει εγκριθεί
12 – 17 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Δεν έχει εγκριθεί
18 – 29 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID)	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Δεν έχει εγκριθεί
30 – 59 ετών	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)
60 και άνω	Pfizer (COMIRNATY) ή Moderna (SPIKEVAX) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Astra Zeneca	1 <sup>η</sup> δόση → 2 <sup>η</sup> δόση	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)

Παρατηρήσεις

^ Η ΕΕΕ συνιστά το μεσοδιάστημα των 8 εβδομάδων μεταξύ των δύο δόσεων του βασικού εμβολιασμού

^^ Για τις ηλικίες 6 μηνών έως 4 ετών, το εμβόλιο Pfizer-BioNTech χορηγείται με μεσοδιάστημα 8 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων

Σε εγκύους συστήνεται η χορήγηση πρώτης ή δεύτερης αναμνηστικής δόσης με επικαιροποιημένο εμβόλιο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μήνες μετά την προηγούμενη δόση

## Πίνακας Δικαιούχων Εμβολίων στην Ελλάδα (3/3)

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το **γενικό πληθυσμό** σχετικά με τον εμβολιασμό του με το εμβόλιο της Johnson & Johnson

Ηλικιακή Ομάδα	Εμβόλια	Αρχικό Σχήμα Εμβολιασμού	1 <sup>η</sup> Αναμνηστική	2 <sup>η</sup> Αναμνηστική	3 <sup>η</sup> Αναμνηστική
<b>Γενικός Πληθυσμός</b>					
18 – 29 ετών	Johnson & Johnson (JANSSEN)*	<b>1 δόση</b>	Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Johnson & Johnson (JANSSEN)*	Μόνο για ομάδες αυξημένου κινδύνου	
30 – 59 ετών	Johnson & Johnson (JANSSEN)*	<b>1 δόση</b>	Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Johnson & Johnson (JANSSEN)*	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με:  Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Συστήνεται εξατομικευμένα με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη 2 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με:  Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)
60 και άνω	Johnson & Johnson (JANSSEN)*	<b>1 δόση</b>	Τουλάχιστον 2 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Novavax (NUVAXOVID) ή Johnson & Johnson (JANSSEN)*	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 1 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)	Τουλάχιστον 3 μήνες μετά την 2 <sup>η</sup> αναμνηστική δόση με: Pfizer (Διδύναμο Επικαιροποιημένο) ή Moderna (Διδύναμο Επικαιροποιημένο)

### Παρατηρήσεις

\* Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί 2 δόσεις του εμβολίου Johnson & Johnson (JANSSEN) σε άτομα άνω των 30 ετών, ο πολίτης συστήνεται να προγραμματίσει μία αναμνηστική δόση με επικαιροποιημένο διδύναμο εμβόλιο

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες συστάσεις της ΕΕΕ σε άτομα με προηγούμενη νόσηση από κορωνοϊό δίνεται η δυνατότητα αναμνηστικού εμβολιασμού με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 3 μηνών μετά τη νόσηση.